


1. Vissen

RONDBEKKEN

1. Hoe heet de hierbij afgebeelde vis ? In plaats van wervels heeft hij een elastische ruggegraat. Hij wordt max. 1 m lang en bezit twee rugvinnen. Voorbij het oog zitten zeven kieuwopeningen en zijn mondschijf bestaat uit meerdere rijen ringvormige tanden. Hij is olijfgroen gemarmerd op de rug en de flanken; de buikzijde is gebroken wit.



Wet. ben. *Petromyzon marinus* (Lin.), Ndl. zeeprik, Fr. grande lamproie marine.

2. Hoe heet deze vis ? Hij behoort tot dezelfde familie als de vorige, maar hij is veel kleiner (max. 0,5m). Voorbij het oog zitten weer zeven kieuwopeningen en de mondschijf bestaat uit een rij hoorntanden. De rug is donkergrijs en de buikzijde zilverwit.




Wet. ben. *Lampréta fluvialis* (Lin.), Ndl. rivierprik, Fr. petite lamproie de mer.

KRAAKBEENVISSEN


A. Haaien

3. Hoe heten in het dialect het soort vissen die geen "graten" hebben, maar wel "kraakbeen" ?
4. Hoe noemt men de soort bloeddorstige vissen die voorkomen in de film "Jaws" ?
5. Hoe heet deze vis ? Zijn snuit is vrij lang en kegelvormig en zijn lichaam is het hoogst in het midden. Hij wordt max. 3,5 m lang, maar in de Noordzee is hij meestal kleiner. De rugzijde is grijs-blauw gekleurd, de flanken zijn grijs en de buikzijde witachtig.



Wet. ben. *Lamna nasus* (Bonnaterre), Ndl. haringhaai of neushaai, Fr. taupe.

6. Hoe heet deze grote vis die wel tot 11 m lang kan worden, hoewel in de Noordzee slechts 8 m. Hij heeft zeer lange kieuwspleten; de rug is grijsbruin tot zwart, de buikzijde vuilwit.



Wet. ben. *Cetorhinus maximus* (Gunnerus), Ndl. reuzehaai, Fr. p  lerin.

7. Hoe heet deze vis die gemakkelijk te herkennen is aan de lange bovenlob van zijn staartvin ?

Hij wordt tot 5 m lang; de rugzijde is grijs tot donkerblauwgrijs, de flanken zijn gevlekt en de buikzijde is witachtig.



Wet. ben. *Alopias vulpinus* (Bonnaterre), Ndl. voshaai, Fr. requin renard.


8. Hoe heet deze veel voorkomende vis van max. 1 m lang. De anaalvin reikt tot het begin van de tweede rugvin.



De neusflappen zijn bijna volledig met elkaar vergroeid en komen tot aan de bovenlip. De rugzijde is zandkleurig met kleine bruinachtige vlekjes, de buikzijde is vaalwit.

Wet. ben. *Scyliorhinus canicula* (Lin.), Ndl. hondshaai, Fr. petite rousette.

9. Deze vis wordt tot anderhalve meter lang. De anaalvin reikt tot het midden van de tweede rugvin.



De neusflappen zijn breed, niet vergroeid en bereiken de bovenlip niet. Op de rug en de flanken zijn grote zwarte en witte vlekken; de buikzijde is vuilwit.


Wet. ben. *Scyliorhinus stellaris* (Lin.), Ndl. kathaai of grootgevekte hondshaai, Fr. grande rousette.

10. Hoe heet deze vis die max. 1,7 m lang wordt ?

De anaalvin ligt juist onder de tweede rugvin en is even groot.


Hij bezit enkele rijen scherpe driehoekige tanden. De rug en de flanken zijn grijsachtig bruin, de buik is vuilwit.

Wet. ben. *Guleorhinus galeus* (Lin.), Ndl. ruwe haai of steenhaai, Fr. milandre.




11. Deze vis lijkt nogal op de vorige, maar de anaalvin is kleiner dan de tweede rugvin en begint ongeveer halfweg onder deze laatste.

De neusflappen zijn smal en in tegenstelling tot de vorige zijn de tanden van deze vis grijsachtig met witte vlekken, de buikzijde is geelwit. Wet. ben. *Mustelus asterias* (Cloquet), Ndl. toonhaai, Fr. émissole tacheté.




12. Deze vis kan tot 4 m lang worden en heeft een kop met afgeplatte, zijwaarts gerichte lobben, waarop de ogen zitten. De rugzijde is bruinachtig, de buikzijde lichter gekleurd.

Wet. ben. *Sphyrna zygaena* (Lin.), Ndl. hamerhaai, Fr. requin marteau.




13. Hoe heet deze vis die maximaal 1,2 m lang wordt ? Voor de rugvinnen staat een stevige stekel. De anaalvin ontbreekt. De rugzijde is grijsachtig, de buikzijde vuilwit.

Wet. ben. *Squalus acanthias* (Lin.), Ndl. doornhaai, Fr. aiguillat commun.




14. Deze vis kan tot 6,4 m lang worden. Hij heeft twee kleine rugvinnen, waarvan de eerste zich ongeveer in het midden van het lichaam bevindt.


De anaalvin ontbreekt en de kieuwspleten zijn erg klein. De rugzijde is grijsbruin, de buikzijde lichter. Het vlees van deze vis is alleen gedroogd eetbaar; hij wordt vooral gevangen om traan uit zijn lever te winnen. Wet. ben. *Somniosus microcephalus* (Schneider), Ndl. groenlandse haai of ijshaai, Fr. dormeur.




15. De hier afgebeelde vis komt niet voor in Belgische wateren, wel in het noorden en uiterste westen van het Kanaal. Hij is blauw gekleurd en heeft een gladde huid. Hij wordt tot 4 m lang, heeft een puntige snuit en driehoekige tanden met gekartelde randen.
- Wet. ben. *glyphis glaucus*, Ndl. blauwe haai, Fr. requin bleu.




16. Hoe noemt men het eikapsel van eierleggende haaien ?



17. Hoe heet deze vis die ongeveer 1,80 m lang wordt. Zijn lichaam is afgeplat, de kop is erg breed en voor de neusgaten zitten er franjevormige aanhangsels. De rugzijde is grijsbruin tot zandkleurig, de buikzijde is witachtig.
- Wet. ben. *Squatina squatina* (Lin.),
Ndl. zeeëngel, Fr. ange de mer.



18.




Hoe noem je de volgende onderdelen van de haai ?

18. A 19. B 20. C 21. D 22. E 23. F



B. Roggen

24. Hoe heten in je dialect vissen die ruitvormig afgeplat zijn en die op de zeebodem leven ?

25. Hoe heet het mannetje van dit soort vissen ?
Het is te herkennen aan de twee aanhangsels (voortplantingsorganen) onderaan het lichaam ?




26. Hoe heet het vrouwtje ? Die is te herkennen aan het ontbreken van de aanhangsels.




27. Hoe heet de vis van deze afbeelding ?
Het lichaam is afgeplat en tamelijk cirkelvormig met een korte dikke staart.
De vis kan gevaarlijke elektrische stroomstoten afgeven. Wet. ben. *Torpedo marmorata* (Risso), Ndl. gemarmerde sidderrog, Fr. torpille marbrée.

28. Hoe heet deze soort die het meest in onze zeeën wordt aangetroffen. De mannetjes worden tot 70 cm, de vrouwtjes tot 1 m lang. De rugzijde is geelbruin met grijze en donkere vlekken en bezet met veel stekels.
Wet. ben. *Raja clavata* (Lin.), Ndl. stekelrog, Fr. raie bouclée.




29. Hoe heet deze soort, waarvan de vrouwelijke exemplaren tot 75 cm lang worden. De mannetjes blijven veel kleiner. De borstvinnen (vleugels) zijn bezet met doornen. De rugzijde is zandkleurig tot bleekbruin met grote donkere




stippen, die soms op de borstvinnen een

cirkelvormig patroon vormen. Wet. ben. *Raja montagui* (Fowler), Ndl. gladde rog, Fr. raie douce.


30. Deze soort wordt tot 2,5 m lang. De snuit is zeer spits. Tussen de rugvinnen kan men 1 tot 3 stekels aantreffen en op de staart loopt een enkele rij stekels.
Wet. ben. *Raja batis* (Lin.), Ndl. vleet, Fr. raie grise, pocheteau gris.





31. Deze vis wordt ongeveer 1,20 m lang. Hij heeft geen stekels; de rugzijde is lichtbruin met enkele vuilwitte vlekken en dicht bezet met donkere stippen tot tegen de rand van de vinnen en op de staart.


Wet. ben. *Raja brachyura* (Lafont),
Ndl. blonde rog, Fr. raie lisse.




32. Deze soort wordt maximaal 70 cm lang en bezit veel kleine stekeltjes op de staart. De rugzijde is duidelijk grijsbruin met twee duidelijke zwart en geel gevlekte "ogen" in het midden van de vleugels.

Wet. ben. *Raja naevus* (Müller en Henle),
Ndl. grootoogrog, Fr. raie fleurie.



33. Deze vis is een zuidelijke soort. De rugzijde ervan is grijsbruin met talrijke witte lijnen en onregelmatige vlekken. Deze lopen dikwijls evenwijdig met de vinrand. Deze soort heeft ook twee "ogen", maar ze zijn veel kleiner dan die van de vorige. Wet. ben. *Raja microocellata* (Montagu), Ndl. kleinoogrog, Fr. raie môle.



34. Deze vis is eveneens een zuidelijke soort die tot 1 m lang kan worden. Hij heeft een typisch patroon van grillige, donkere lijnen op de rug. Wet. ben. *Raja undulata* (Lacépède), Ndl. golfrog, Fr. raie.





35. Het lichaam van deze vis is schijfvormig met hoekige vinnen; de snuit is tamelijk puntig. De bovenkant van de huid is ruw met twee rijen stekels langs de staart. Hij is bovenaan eenkleurig grijs of bruin met donkere vlekken en onderaan wit. Hij kan tot een goeie meter lang worden. Wet. ben. *Raja fullonica* (Lin.), Ndl. kaardrog, Fr. raie chardon.




36. Deze vis is een noordelijke soort die tot maximaal 70 cm lang wordt. Hij heeft veel grote stekels met stervormige basis op zijn rug en staart. De bovenzijde is lichtbruin met donkerbruine en gele vlekjes; de onderzijde is wit. Wet. ben. *Raja radiata* (Donovan), Ndl. sterrog, Fr. raie étoilée.

37. Deze soort heeft opvallend ronde borstvinen. De huid is ruw aan de bovenzijde en glad aan de onderzijde. De bovenzijde is licht-, donker- of roodbruin met 4 à 6 kleine witachtige vlekken in een symmetrisch patroon. Deze vis kan tot 1,20 m lang worden. Wet. ben. *Raja circularis* (Couch), Ndl. zandrog, Fr. raie ronde.



38. De hier afgebeelde vis wordt tot 1,40 m lang. Halverwege de staart zitten één of twee zaagvormige stekels, die in verbinding staan met een gifklier. De rugzijde is olijffbruin tot grijsachtig; de buikzijde is vuilwit. Wet. ben. *Dasyatis pastinace* (Lin.), Ndl. pijlstaartrog, Fr. pastenague.



Hoe noem je de volgende onderdelen van een rog ?

39. A. 40. B. 41. C. 42. D. 43. E.
 44. F 45. G. 46. H.


BEENVISSEN

A. Rondvissen

47. Hoe noemt men in het dialect vissen die "rond" zijn ?


48. Hoe noemt men vissen die "plat" zijn ?

49. Hoe heet in het dialect
 deze vis ? Hij wordt
 max. 3,5 m lang en trekt
 de rivieren op om te paaien.




Wet. ben. *Acipenser sturio* (Lin.), Ndl. steur, Fr. esturgeon.

50. Hoe heet deze vis die hoofd-
 zakelijk in zoet water
 leeft, maar naar zee trekt
 om te paaien ? De wijfjes
 worden tot één meter lang, de mannetjes
 maar tot een halve meter. Hij wordt veel
 gevist door sportvissers. Wet. ben.
anguilla anguilla (Lin.), Ndl. paling of
 aal, Fr. anguille.



51. Hoe heet een klein, onvolwassen exemplaar van deze soort ?

52. Hoe heet deze vis van dezelfde soort ? Hij wordt tot 2,75 m lang. De bovenkaak steekt voor de onderkaak uit.




De borstvinnen zijn puntig en de rugvin begint direkt achter de borstvinnen. De rug- en anaalvin zijn met zwart omzoomd. Men


vangt af en toe kleine exemplaren voor onze kust.

Wet. ben. conger conger (Lin.), Ndl. kongeraal, zeepaling, Fr. congre.

53. Hoe heet deze veel voorkomende vis ? Hij wordt tot 43 cm lang. De rugzijde is blauw en gaat over naar zilverwit op de buikzijde. Wet. ben. Clupea harengus (Lin.), Ndl. haring, Fr. hareng.




54. Hoe noemt men een jonge, onrijpe, onvolwassen haring ?




55. Hoe noem je dit visje ? Het wordt maximaal 17 cm lang. De rugzijde is blauwgroen en gaat over naar zilverwit op de buikzijde. Wet. ben.

Sprattus sprattus (Lin.), Ndl. sprot, Fr. brisling.


56. Hoe heet dit visje, dat max. 25 cm lang wordt ? De schubben zijn groot en de kieuwdeksels zijn radiair gegroefd. De rugzijde is blauw-groenachtig, met een gouden schijn op de flanken; de buikzijde is zilverwit. Soms heeft het vier of meer donkere vlekken op de flanken. Deze vis wordt veel ingeblikt. Wet. ben. Sardina pilchardus (Walbaum), Ndl. sardien, Fr. sardine.



57. De hier afgebeelde vis wordt max. 60 cm lang. Deze vis lijkt goed op die van de volgende vraag, maar kan er het best van onderscheiden worden door het grote aantal kieuwaanhangsels op de eerste kieuwboog. De rugzijde is blauwachtig; de flanken hebben een gouden schijn met soms een zwarte vlek erop. Deze vis zwemt de rivieren op om te paaïen. Wet. ben. Alosa alosa (Lin.), Ndl. elft, Fr. alose.




58. Deze vis lijkt veel op de vorige, maar men telt minder kieuwboog-aanhangsels op de eerste kieuwboog.




De rugzijde is blauwachtig, de buikzijde is zilverachtig en de flanken hebben een gouden schijn. Op die flanken zitten meestal zes tot acht zwarte vlekken. Wet. ben. *Alosa fallax* (Lacépède), Ndl. fint, Fr. alose finte. (Het is goed mogelijk dat deze en de vorige soort met één dialectbenaming aangeduid worden.)

59. Hoe heet dit visje dat tot 20 cm groot kan worden? De rugzijde is lichtgroen tot blauw, de flanken en de buikzijde zijn zilverwit. Dit visje wordt




af en toe gevangen in het voorjaar. De soort wordt vaak ingeblikt. Wet. ben. *Engraulis encrasicolus* (Lin.), Ndl. ansjovis, Fr. anchois.

60. Hoe heet deze vis die maximaal 30 cm lang wordt? De onderkaak steekt wat vooruit en de anaalvin bestaat uit 18 tot 20 vinstralen.



De kleur is vrij transparant; de rugzijde is blauwgroen, de buikzijde witgeel. Deze vis zwemt de rivieren op om te paaien. Wet. ben. *Osmerus eperlanus* (Lin.), Ndl. spiering, Fr. éperlan.

61. Deze commercieel zeer gegeerde vissoort heeft een typische roze vleeskleur en wordt tot 1,5 m lang. Het uiteinde van



de muil komt niet voorbij de oogbol en de vis bezit een vetvin. Hij is momenteel zeer zeldzaam in onze wateren. Wet. ben. *salmo salar* (Lin.), Ndl. zalm, Fr. saumon.


62. Hoe heten de vissen van deze soort die in de paaitijd de rivieren opzwemmen?

63. Als de benaming verschilt: de mannelijke?

64. en de vrouwelijke?

65. Hoe heten jonge zalmen tot de leeftijd van ongeveer 8 maand ? Ze zijn nog lichtbruin van kleur.
66. Daarna worden de jonge zalmen zilverwit met zwarte vinnen. Ze beginnen dan naar zee te trekken. Hoe heten ze in dit levensstadium ?
67. Hoe heette de zalm die eertijds in de zomer, vooral in juli, gevangen werd ?


68. Hoe heet deze vis die enigszins lijkt op de vorige soort, maar kleiner en gedrongener is ? Zijn vlees wordt ook zeer gewaardeerd.



Hij heeft eveneens een vetvin, maar het uiteinde van de muil komt voorbij de oogbol. Kleine exemplaren trekken de rivieren op om te paaïen. Wet. ben. *Salmo trutta* (Lin.), Ndl. zeeforel, Fr. truite de mer.

69. Hoe heet een klein exemplaar van deze soort ?


70. Hoe heet deze vis met een grote en brede kop ? Hij wordt max. 2 m lang. De eerste rugvinstraal is



alleenstaand en verlengd, en is voorzien van een vlezig aanhangsel om een prooi aan te trekken. Wet. ben. *Lophius piscatorius* (Lin.), Ndl. zeeduivel, Fr. baudroie.

71. Hoe heet de alleenstaande en verlengde eerste rugvinstraal waaraan een gevorkt vlezig aanhangsel vastzit om prooien te verschalken ?

72. Hoe heet deze in onze zeeën veel geviste vissoort die tot 1,65 m lang kan worden ? De bovenkaak steekt vooruit en aan de onderkaak zit een



lange kindraad. De rug en de flanken zijn olijfbraun tot zandkleurig met donkere en lichtere vlekken. De zijlijn en de buikzijde zijn witachtig. Wet. ben. *Gadus morhua* (Lin.), Ndl. kabeljauw, Fr. cabillaud.

73. Hoe noem je een heel kleine kabeljauw tot ongeveer 30 cm groot ?
74. Hoe heet een kleine kabeljauw van ongeveer 2 kg ?

75. Hoe heet een kleine kabeljauw van ongeveer 3 kg ?
76. Hoe heet een kabeljauw van ongeveer 4 kg ?
77. Hoe heet een kabeljauw van ongeveer 7 kg ?
78. Hoe heet een zeer grote kabeljauw van ongeveer 9 kg ?

79. Hoe heet de hier afgebeelde vis ? Hij wordt max. 80 cm lang. Zijn bovenkaak steekt

meestal naar voren en

aan de onderkaak zit een heel


korte kindraad. De eerste rugvin is erg

scherp. De rug is grijsachtig, de flanken zilverachtig

en de buikzijde wit. Op de flanken zit een grote zwarte vlek en een

zwarte zijlijn. Wet. ben. *Melanogrammus aeglefinus*, Ndl. schelvis,

Fr. eglefin.



80. Hoe heet deze vis die max.

70 cm groot wordt ? Zijn

bovenkaak steekt iets meer


naar voren. De volwassen dieren

hebben geen kindraad. De rug is groen-

blauw, de flanken en de buikzijde zilverkleurig. Boven aan de basis

van de rugvin zit een zwarte vlek; de zijlijn is bruinachtig. Wet.

ben. *Merlangius merlangus* (Lin.), Ndl. wijting, Fr. merlan.



81. Hoe heet een klein, onvolwassen exemplaar van deze vissoort ?

82. Hoe heet een vis van deze soort ?

Hij behoort tot dezelfde



familie als vorige

soort en is er het ge-

makkelijkst van te onder-

scheiden door zijn blauwe kleur.

Wet. ben. *Merlangus poutassou* (Risso), Ndl. blauwe wijting, Fr. poutassou



83. De hier afgebeelde vis wordt max.

45 cm lang. Boven- en onderkaak

zijn even lang. De anaalvinnen zijn

niet van elkaar gescheiden en onge-


veer de helft van de lengte van de

borstvinnen reikt voorbij het begin


van de anaalvin. De rugzijde is geelbruin,

de flanken zijn gelig en de buikzijde is wit. Op het lichaam zitten 4 à 5 donkere vertikale banden en een grote zwarte vlek aan de basis der borstvinnen. Wet. ben. *Trisopterus luscus* (Lin.), Ndl. steenbol, Fr. tacaud, gode.


84. Deze vis is verwant aan de voorgaande, maar kleiner. Hij wordt max. 26 cm lang. De bovenkaak steekt vooruit en aan de onderkin zit een zeer lange kindraad. De anaalvinnen zijn van elkaar gescheiden en het uiteinde van de borstvinnen reikt iets voorbij de anaalvin. De rugzijde is geelbruin, de flanken zijn goudkleurig en de buikzijde is zilvergrijs. Boven de borstvinnen zit een kleine zwarte vlek. Wet. ben. *Trisopterus minutus* (Lin.), Ndl. dwergbol, Fr. capelan de France.




85. Hoe heet deze vis die max. 1,30 m lang wordt? De onderkaak steekt voorbij de bovenkaak en draagt geen kindraad. Het uiteinde van de borstvinnen reikt voor het begin van de anaalvinnen. De rug is bruin of groenachtig, de flanken zijn geelgroen en de buik is wit. De donkere zijlijn loopt met een grote boog boven de borstvin. Wet. ben. *Pollachius pollachius* (Lin.), Ndl. pollak, Fr. lieu jaune, colin jaune.



86. Wat is de dialektbenaming voor deze vis die tot 1,30 m lang wordt? De onderkaak is iets vooruitstekend en draagt een korte kindraad. Het uiteinde van de borstvinnen reikt niet tot aan de anaalvin. De rug is donkergroen tot zwart, de flanken zijn grijsachtig en de buik is zilverachtig. Er is een bijna rechtlijnige gebroken witte zijlijn. Wet. ben. *Pollachius virens* (Lin.), Ndl. koolvis, Fr. lieu noir, colin noir.



87. Hoe heet dit visje dat ongeveer 25 cm lang wordt en algemeen aan onze kust voorkomt? Op de kop heeft het vijf tastdraden: één aan de kin en vier op de snuit. De rug is



donkerbruin, de flanken en de buik zijn grijsbruin. Wet. ben. *Ciliata mustela* (Lin.), Ndl. vijfdradige meun, Fr. motelle à cinq barbillons.

88. Hoe heet de iets grotere vis (tot 40 cm)

van dezelfde familie met

slechts vier tastdraden ? Wet. ben. *Motella cimbria* (Lin.), Ndl. vierdradige meun, Fr. motelle à quatre barbillons.

89. Ook tot dezelfde familie behoort deze nog iets grotere vis (tot

50 cm) met slechts drie tastdraden. Hij is helemaal lichter van

kleur maar heeft donkere vlekken. Wet. ben. *Motella tricirrata* (Lin.), Ndl. driedradige meun, Fr. motelle à trois barbillons.

90. Hoe heet de hier afgebeelde vis ? Zijn lijf

is lang en smal; hij wordt tot 2 m lang. De

bovenkaak reikt tot voorbij de onderkaak en op de kin draagt hij een baarddraad. De tweede rugvin is erg verlengd. Zijn kleur is bruingroen met onregelmatige vlekken. Wet. ben. *Molva molva* (Lin.), Ndl. leng, Fr. lingue, julienne.

91. Hoe heet een vis van deze

soort ? Hij wordt ongeveer 35 cm lang, heeft

een brede kop en bezit een kleine kindraad. Hij is zwart

tot donkerbruin met een licht blauwe schijn. Wet. ben. *Raniceps raninus* (Lin.), Ndl. vorskwal, Fr. trident.

92. Hoe heet deze vis die max. 1,80 m lang wordt ?

De onderkaak steekt vooruit





en op de kaken zitten 2 tot

3 rijen grote, scherpe tanden. De rug is grijsachtig,


de flanken zijn zilverachtig en de buik is zilverwit. Bij de volwassen

dieren zijn de mondholte en de binnenkant van de kieuwdeksels zwart


gekleurd. Wet. ben. *Merluccius merluccius* (Lin.), Ndl. heek, mooie meid, Fr. merlu(che).





93. Hoe heet deze vis met een karakteristieke inkeping tussen de rug- en staartvin. Hij wordt tot 50 cm lang. Deze vis is levendbarend. Men vindt hem meestal in havens en inhammen. De kleur is variabel, maar in onze wateren is de rug meestal groenbruin, de buik grijsachtig en de buikvinnen geel-oranje. Wet. ben. *Zoarces viviparus* (Lin.), Ndl. puitaal, Fr. loquette.



94. Hoe heet deze lange, smalle vis die tot 90 cm lang wordt ? Kenmerkend zijn zijn snavelvormige bek met hele kleine scherpe tanden en zijn groene graten. Wet. ben. *Belone belone* (Lin.), Ndl. geep, Fr. orphie, aiguille(tte).




95. Hoe heet de aan de voorgaande vis nauw verwante soort ? Hij telt meer vinnen. Wet. ben. *Scomberesox saurus* (Waldbaum), Ndl. makreelgeep, Fr. orphie maquereau.




96. Het hier afgebeelde visje wordt max. 20 cm lang. De anaalvin heeft 2 stevige en 13 tot 16 zachte vinstralen. De rugzijde is lichtgroen met witte stippen, op de flanken loopt een zilverachtige streep en de buikzijde is wit of zilverwit. Wet. ben. *Atherina presbyter* (Cuvier), Ndl. koornaarvis, Fr. prêtre.


97. Hoe noem je in het dialect deze soort ? De vis wordt tot 65 cm lang. Het lichaam is hoog en zijdelings afgeplat, de muil is uitstulpbaar. De rugzijde is bruinachtig, de flanken zijn geel en grijs en de buikzijde is zilverachtig. Op de flanken zit een zwarte vlek. Wet. ben. *Zeus faber* (Lin.), Ndl. zonnevis, Fr. saint-pierre.




98. Hoe heet deze vis die in vorm op de vorige lijkt, maar groter wordt, nl. tot 1,50 m. Zijn lichaam is hoog en zijdelings samengedrukt. De mond is licht uitstulpbaar en heeft geen tanden. De rugzijde is staalblauw, de flanken groenachtig met een roze schijn en de buik is zilverachtig roze. Het hele lichaam is bezaaid met zilverachtige vlekken; de vinnen zijn rood. Wet.ben. *Lampris luna* (Gmelin), Ndl. koningsvis, Fr. poisson lune.




99. Hoe heet dit kleine visje, dat max. 10 cm lang wordt? Het leeft zeer dicht bij de kust en in inhammen evengoed als in zoet water. Op de rug staan drie afzonderlijke stekels, de derde is erg klein. De kleur is erg variabel: meestal grijsgroen op de rugzijde met zilverwitte buik en flanken. In de paaitijd hebben de mannetjes een rode buik en blauwe ogen. Wet. ben. *Gasterosteus aculeatus* (Lin.), Ndl. stekelbaars, Fr. épine.



100. Hoe noem je deze soort? Hij wordt max. 20 cm lang, is langgerekt van vorm en heeft een scherpe snuit. Op zijn rug zitten 14 à 16 alleenstaande, kleine stekels. De rug en de flanken zijn groenachtig bruin, over die flanken lopen donkere banden. De buik is geelachtig. Wet.ben. *Spinachia spinachia* (Lin.), Ndl. zeestekelbaars, Fr. épine de mer.



101. Hoe heet deze langwerpige vis die max. 45 cm lang wordt? Hij heeft een erg lange snuit en hij is lichtbruin of lichtgroen gekleurd. Wet. ben. *Syngatus acus* (Lin.) Ndl. (grote) zeenaald, Fr. aiguille de mer.




102. Hoe noem je deze soort die verwant is aan de vorige, maar veel kleiner, nl. tot ongeveer 17 cm. De kleur is bruinachtig. Wet.ben. *Syngnathus rostellatus* (Nilsson), Ndl. kleine zeenaald, Fr. petite aiguille de mer.




103. De hierbij afgebeelde vis is eveneens aan de vorige twee verwant, maar wordt dan iets groter, nl. tot 30 cm. Zijn snuit is lang, hoog en zijdelings samengedrukt. De kleur is variabel, maar meestal bruinachtig met kleine witte strepen. Wet.ben. *Siphonostoma* (Lin.) Ndl. trompetterzeenaald, Fr. siphonostome.



104. Hoe heet het hierbij afgebeelde zeedieltje, dat nu erg zeldzaam geworden is in onze kustwateren ? De kleur is erg variabel. Wet. ben. *Hippocampus ramulosus* (Leach), Ndl. zeepaardje, Fr. hippocampe moucete, cheval marin.




105. Hoe heet deze vis die ongeveer 75 cm lang wordt ? Zijn schubben op de zijlijn zijn glad; de rug en de flanken zijn roodachtig bruin, de buik is witachtig. De borstvinnen reiken tot voorbij het begin van de anaalvin; ze zijn aan




de bovenzijde blauw met een rode rand en groene vlekken. Wet. ben. *Trigla lucerna* (Lin.), Ndl. rode poon, Fr. grondin perlan of grondin galinette.

106. Hoe heet deze vis die verwant is aan de vorige, maar kleiner ? Hij wordt ongeveer 40 cm lang. In tegenstelling tot de vorige zitten er hoge schubben op de zijlijn, die lijken op een ritssluiting.




De rug en de flanken zijn roodachtig, de buik rozig met een zilveren schijn. De eveneens lange borstvinnen zijn donker. Wet. ben. *Aspitrigla cuculus* (Lin.), Ndl. Engelse poon, Fr. grondin rouget of grondin rose.

107. Deze vis is eveneens verwant aan de vorige twee; hij wordt ook ongeveer 40 cm lang. De schubben en de zijlijn zijn voorzien van stekeltjes. De rug en de flanken zijn grijsbruin, soms roodbruin met witte vlekjes. De buikzijde is witachtig. De rugvin heeft een zwarte vlek. Wet. ben. *Eutrigla gurnardus* (Lin.),




Ndl. grauwe poon, Fr. grondin gris of gournard.




108. Ook deze vis is verwant aan de vorige drie en wordt ongeveer 40 cm lang. De borstvinnen reiken tot voorbij de anaalvin. De schubben op de zijlijn zijn voorzien van kleine stekeltjes. De snuit is stomp. De rug en de flanken zijn roodachtig met donkere vlekken, de buik is witgeel en over het hele lichaam lopen schuine strepen. Wet. ben. *Trigloporus lastovitza* (Brunnich), Ndl. gestreepte poon, Fr. grondin imbriago.

109. Kent u in uw dialect een gemeenschappelijke benaming voor de vier laatst genoemde vissoorten ? Welke ?

110. Hoe noem je deze vis ? Hij wordt max. 30 cm lang. De bovenste stekel op het voorkieuwdeksel is kleiner dan de oogdiameter. De zijlijn is glad; de rug en de flanken zijn grijsbruin met donkere vlekken, de buikzijde van het mannetje is rood en wit gevlekt. Wet. ben. *Myoxocephalus scorpius* (Lin.), Ndl. zeedonderpad, Fr. chabbot.




111. Hoe heet deze vis die verwant is aan de vorige, maar veel kleiner : max 17 cm. De rug en de flanken zijn groenbruin gevlekt, de buik is geelachtig. De onderkant van de kop van het wijfje is bezet met donkere vlekjes. Wet. ben. *Cottus bubalis* (Euphasen), Ndl. groene zeedonderpad, Fr. cotte à longues



112. Wat is de dialectbenaming van deze vis van circa 15 cm lang ? Het lichaam is volledig bezet met beenplaten en onder de kop zitten veel korte kindraden. De rugzijde en de flanken zijn grijsbruin met 4 tot 5 donkere zadelvlekken op de rug. De buik is vuilwit. Wet. ben. *Agonus cataphractus* (Lin.), Ndl. harnasmannetje, Fr. souris de mer.






113. Hoe heet deze roofvis met een rondachtig lichaam, dat bedekt is met rijen benige knobbels en met een stompe kop. Het wijfje wordt maximaal 70 cm en het mannetje 50 cm lang. Aan de buikzijde zit een zuignap,


die gevormd wordt door de vergroeide buikvinnen. De jonge dieren zijn groenblauw van kleur, de volwassene iets grijzer. In de paaitijd hebben de mannetjes een rode buikzijde. Wet. ben. *Cyclopterus lumpus* (Lin.), Ndl. snotolf, Fr. lompe, poule de mer.

114. Hoe heten de eieren van deze vis ?




115. Hoe heet deze verwante vis die eveneens aan de buikzijde een zuignap bezit uit de vergroeide buikvinnen ? De rug- en de anaalvinnen zijn verbonden met de staartvin. Dit visje wordt tot 15 cm lang en is erg variabel van kleur, meestal heeft het strepen over de hele lengte van het lichaam. Wet. ben. *Liparis liparis* (Lin.), Ndl. slakdolf, Fr. limace barrée.

116. Hoe heet deze vis die tot bijna 1 m lang wordt ? De eerste rugvin bestaat uit 8 tot 9 stevige stralen en op de onderrand van het voorkieuwdeksel zitten meerdere stekels.



De rug is grijsachtig, de flanken zijn zilverkleurig en de buik is zilverwit. Op het kieuwdeksel zit een donkere vlek. Wet. ben. *Dicentrarchus labrax* (Lin.), Ndl. zeebaars, Fr. bar commun.

117. De hier afgebeelde vis wordt ongeveer een halve meter lang.



Op de zijlijn bevindt zich een rij van grote benige schubben. De rugzijde is grijsblauw, de flanken zijn zilverachtig en de buik is wit. Op het uiteinde van het kieuwdeksel zit een donkere vlek. Wet. ben. *Trachurus trachurus* (Lin.), Ndl. horsmakreel, Fr. chinchard.

118. Deze vis wordt max. 50 cm lang.


Hij heeft een hoog lichaam
en een kleine kop. De rugvin
telt 11 stevige en 12 à 13

zachte vinstralen, de anaalvin
heeft er respektievelijk 3 en 10 à 11.

Er zijn enkele grote tanden vooraan en

veel kleinere achteraan. De rug is grijsachtig, de flanken zijn
zilvergrijs met soms 6 à 7 donkere verticale banden. Wet. ben.

Spondylusoma cantharus (Lin.), Ndl. zeekarper, Fr. griset, canthare.



119. Kent u een dialectbenaming voor deze vis

die verwant is aan de vorige? Hij is

echter veel zeldzamer. Hij wordt even-


eens zo'n 50 cm lang; de kop is stomp

en de mond telt vele kleine tanden. De

rugzijde is grijsrood of roze, de flanken zijn

zilverachtig. Bovenaan achter het kieuwdeksel zit een zwarte vlek.

(geen namen ons bekend)



120. Is er een dialectbenaming voor deze eveneens

zeldzame soort? De kop is puntig. Bij levende



exemplaren is de rugzijde oranjerood, de

flanken zijn roze gekleurd en de buik-

zijde is zilverachtig. De rand van het

kieuwdeksel is karmijnrood. Wet. ben.

Sebastes marinus, Ndl. roodbaars, Fr. sébaste.



121. Hoe noem je deze soort vis?

Hij lijkt erg op de


vorige soort, maar is niet

rood gekleurd en hij bezit

een opvallende zwarte vlek.

Wet. ben. *Tagellus centrodonatus* (De la

Roche), Ndl. zeebrasem, Fr. rousseau.



122. Hoe heet deze vis ?

Hij wordt ongeveer 35 cm lang. Het is een slanke

vis met een vooruitstekende

onderkaak. De rug kan grijsblauw,

grijsgroen of bruinachtig zijn. De zijlijn

is donker en daaronder lopen drie tot vijf lengtestrepen. Wet. ben.

Boops boops (Lin.), Ndl. /, Fr. bogue.

123. Deze vis wordt max. 2 m lang. Hij heeft

een afgeronde snuit en tussen de

eerste en tweede rugvin

is er geen tussenruimte

enkel een inkeping. Ken

merkend is dat zijn

schubben gemakkelijk loskomen. De rug


is meestal zilvergrijs, de flanken zijn wat lichter

met een gouden weerschijn en de buik is zilverwit. Op het kieuw-

deksel zit soms een donkere vlek; de binnenzijde van de mond is

goudgeel. Wet. ben. Argyrosomus regius (Asso), Ndl. ombervis,

Fr. tambour, maigre.



124. Hoe heet deze vis die
max. 40 cm lang wordt ?

De kop is steil en aan

de kin hangen twee lange

kindraden, die in groeven

verborgen kunnen worden. De schubben zijn


groot. Dode exemplaren zijn rooskleurig op de rug en

de flanken, de buik is geelroze. Levende exemplaren variëren van

kleur naargelang van de bewoonde zeediepte en de periode van de


dag. Wet. ben. Mullus surmuletus (Lin.), Ndl. mul, Fr. rouget

de roche.



125. Kent u een dialectbenaming voor deze
zeer zeldzame soort ? Hij wordt tot 70 cm
lang. Het lichaam is zeer slank en lang-
gerekt, de rugvin is lang en begint direkt
achter de kop. De tanden zijn groot en

puntig. De rugzijde en de flanken zijn roodachtig, de buikzijde is
oranjekleurig of geelachtig. De rug- en anaalvin zijn geel met
uitzondering van een rode vlek vooraan in de vin. (geen namen ons
bekend)



126. Hoe heet deze veel voorkomende

vissoort ? Hij wordt tot

70 cm groot en draagt twee

korte gescheiden rugvinnen, waarvan

de voorste met vier stekels. Hij heeft een


korte, brede platte kop en vlezige, dikke bovenlip. De rug is donker-

groen of blauwgroen, de buikzijde is wit. De schubben zijn groot en

laten gemakkelijk los. (Er komt ook een variant voor met dunnere

bovenlip en een andere die goudkleurig is.) Wet. ben. *Chelon*

labrosus (Risso), Ndl. diklipharder, Fr. *mulet lippu*.



127. Hoe noemt men deze vis ? Hij wordt

ongeveer 60 cm lang. Hij heeft

een zeer lange rugvin.

Hij beschikt over stevige

tanden in de kaken en ook

nog keeltanden waarmee hij schaal-


en schelpdieren kan kraken. De kleur

is zeer variabel; in onze wateren komt

meestal de gevlekte soort voor : aan de rug groenbruin gevlekt, aan

de buikzijde wit gevlekt en aan de keel soms rood gestreept. Wet.

ben. *Labrus bergylta* (Ascanius), Ndl. gevlekte lipvis, Fr. *vieille*.



128. Kent u een dialectbenaming voor de volgende

verwante en zeldzame soort ? Hij wordt


niet groter dan 15 cm. De rug is groen-

bruin of roodachtig, de buikzijde zilvergeel.

De mannetjes hebben blauwe vlekken op de rug en

op hun kop lopen blauwe strepen. Op de staartvin loopt er een brede

donkere band. (geen namen ons bekend)



129. Eveneens verwant en zeldzaam is de hierbij


afgebeelde soort. Hij wordt max. 18 cm lang.

De kleur varieert van bruin tot roodachtig met

zwarte vlekjes op de eerste rugvinnen en een zwarte

vlek boven de staartwortel. Wet. ben. *Ctenolabrus rupestris* (Lin.),

Ndl. klip-lipvis, Fr. *cténolabre*.



130. Ken je een naam voor deze eveneens verwante soort ?

De vis wordt tot 25 cm lang; de kleur is varia-


bel, meestal groen of groenbruin. Achter het


oog zit een langwerpige donkere vlek, evenals op

de staartwortel. De mannetjes hebben blauwe strepen

op de kop. Wet. ben. *Crenilabrus melops* (Lin.), Ndl. zwartoog-lipvis,

Fr. *crénilabre*.






131. Hoe heet de hier afgebeelde vis ? Hij wordt max. 40 cm lang. Hij heeft een opwaarts gerichte stekel voor de ogen.

Hij is geelbruin met schuine donkere strepen. Op de rugvin zit een zwarte vlek. De stekels van de eerste rugvin en die van het kieuwdeksel staan in verbinding met een gifklier. Wet. ben. *Trachinus draco* (Lin.), Ndl. grote pieterman, Fr. grande vive.

132.

132. Hoe heet de aan de vorige verwante soort die kleiner is; hij wordt slechts tot 16 cm lang.



De mond staat sterk naar boven gericht. Hij is zandkleurig op de rug en flanken, de buikzijde is lichter gekleurd. De eerste rugvin


is zwart. Dit visje is erg giftig. Wet. ben. *Trachinus vipera* (Cuvier), Ndl. kleine pieterman, Fr. petite vive.

133. Is er een algemene dialectbenaming voor deze giftige vissen ?

134. Hoe noemt men de giftige stekel van deze vissen ?

135. Hoe heet het hierbij afgebeelde visje ?


Het wordt ongeveer 15 cm lang; de kop is steil en zonder tentakels. Het is groen of



bruinachtig gevlekt met een donkere vlek halverwege de rugvin. De mannetjes zijn in de paaitijd zwartkleurig met witte lippen. Het is een rotskustbewoner; men vindt hem dus het meest op golfbrekers en havenhoofden. Wet. ben. *Blennius pholis* (Lin.), Ndl. slijmvis, Fr. pholis, mordocet.

136. De hier afgebeelde vis is verwant aan de


vorige soort, maar wordt wel groter tot ongeveer 30 cm. Boven ieder oog zit een vertakte tentakel en op het neusgat zit een



weinig vertakte tentakel. De kleur varieert van geelbruin tot roodbruin met een zevental donkere dwarsbanden. Wet. ben. *Blennius gattorugine* (Lin.), Ndl. slijmvis, Fr. perce-pierre, cabot.

137. Hoe heet deze vis ? Hij wordt

max. 1,25 m lang. Zijn kop
is zeer groot en hij heeft
grote en sterke tanden. De rugvin is



hoog en lang; buikvinnen zijn afwezig. De rugzijde en de flanken
zijn blauwgrijs of bruinachtig met donkere dwarse banden. Wet. ben.
Anarhichas lupus (Lin.), Ndl. zeewolf, Fr. loup de mer, poisson-loup.


138. Hoe heet de aan de vorige nauw verwante soort, die niet in onze
kustwateren voorkomt ? Hij wordt gekenmerkt door zijn slap,
gelatineus vlees. Wet. ben. *Anarhichas denticulatus* (Lin.), Ndl.
blauwe zeewolf, Fr. loup gelatineux.

139. Een aan de twee vorige verwante vis komt evennin in
onze kustwateren voor. Hij is bruinachtig van kleur en heeft donkere
vlekken, die onregelmatig over de rug en flanken verdeeld zijn.
Wet. ben. *Anarhichas minor* (Olafson), Ndl. gevlekte zeewolf, Fr.
loup tacheté.



140. Hoe noem je dit visje, dat max. 25 cm lang wordt ? Het is een lange,
slanke vis, waarvan de buikvinnen weinig ontwikkeld zijn. Hij is
geel of groenbruin gekleurd met vertikale banden. Op de basis van
de rugvin zitten 9 tot 13 zwarte, met wit omzoomde ronde vlekken.
Wet. ben. *Pholis gunellus* (Lin.), Ndl. botervis, Fr. gonelle.

141. Deze en de volgende vis worden
allicht in benaming niet onder-
scheiden. De hierbij afgebeelde



soort wordt ongeveer 30 cm lang. De tussenkaak is weinig uitstulp-
baar en de buikvinnen ontbreken. De rugzijde en de flanken zijn
blauwgroen, de buikzijde is zilverachtig. Op de kop en voor de ogen
zit een zwarte vlek. Men treft de soort vooral aan op zandige
kusten, waar hij zich bij eb in het vochtige zand kan begraven.
Wet. ben. *Hyperoplus lanceolatus* (Le Sauvage), Ndl. smelt, Fr. grand
lançon.

142. Deze verwante soort is iets kleiner, tot ongeveer 25




cm lang. De tussenkaak is zeer ver uitstulpbaar. Op de basis van de staartvin zitten schubben en de schubben op de buik vormen een V-vormig patroon. De rugzijde is geelgroen, de flanken zijn geel en de buik is zilverachtig. Wet. ben. *Ammodytes tobianus* (Lin.), Ndl. zandspiering, Fr. lançon.

143. Hoe heet deze vis, waarvan de mannetjes ongeveer 30 cm lang worden en de vrouwtjes een 20-tal cm? De mannetjes hebben een lange eerste rugvin en staartvin. Ze zijn geelbruin met blauwe strepen en vlekken. De wijfjes zijn zandkleurig en hebben 6 bruine vlekken op de flanken en 3 op de staart. Wet.




ben. *Callionymus lyra* (Lin.), Ndl. pitvis, Fr. dragonet lyre.


144. Hoe heet de aan de vorige verwante maar veel kleinere vis? De mannetjes worden 10, de wijfjes 8 cm lang. Op het voorkieuwdeksel zitten 3 stekels. De mannetjes hebben eveneens een lange eerste rug- en staartvin. Bij de volwassen mannetjes hebben die rugvinnen donkere vlekken, blauwe en witte lijnen en vlekjes. De rugzijde en de flanken zijn oranjebruin met blauwe vlekken op de flanken en zadelvlekken op de rug. (geen namen ons bekend)




145. Hoe heet deze vis? Hij wordt ongeveer 15 cm. Hij heeft een zwarte kop en zijn kleur is erg variabel. Meestal is hij echter donkerbruin met donkere tot bijna zwarte vlekken. Wet. ben. *Gobius niger* (Lin.), Ndl. govie, Fr. gobie noir.




146. Kent u dit visje en zijn naam? Het is verwant aan de vorige maar is veel kleiner; ongeveer 6 cm. Het doorschijnend lichaam is zijdelings afgeplat en de bek is schuin naar boven gericht. Wet. ben. *Aphyra minuta* (Risso), Ndl. doorschijnende govie, Fr. nonnat.





147. Ook deze vis is verwant aan de twee vorige. Hij wordt max. 7 cm lang; hij is lichtgrijs tot zand-

kleurig met een netwerk van donkere stipjes, vooral duidelijk op de rug. Op de flanken zitten 5 roestbruine vlekken. De mannetjes hebben in de paaitijd 5 of 6 brede dwarsbanden en een zwarte met wit omzoomde vlek op de eerste rugvin. De vrouwtjes dragen een snorretje. Wet. ben. *Pomatoschistus minutus* (Pallas), Ndl. dikkopje, Fr. gobie buhotte.



148. Hoe noemt u in uw dialect de hierbij afgebeelde vis ? Hij


wordt max. 65 cm lang. De

rugzijde is blauwgroen met zwarte

lijnen en vlekken, de buikzijde is witachtig. Wet. ben. *scomber scombrus* (Lin.), Ndl. makreel, Fr. maquereau bleu.

149. Kent u deze zeer zeldzame vis en eventueel zijn naam ?



Hij wordt max. 25 cm lang en heeft een zeer kenmerkende vorm; vooral de langgerekte snuit is opvallend. (namen ons niet bekend)



150. Kent u deze vis en misschien zijn naam ?

Hij wordt ongeveer 50 cm lang en heeft een zwarte vlek op het kieuwdeksel.

(namen ons niet bekend)




151. Hoe heet deze grote vis die vooral in warmere wateren dan de Noordzee voorkomt ? Hij wordt tot 3 m lang. De

vissoort wordt hier vooral in blik gegeten. Wet. ben. *Thunnus thynnus* (Lin.), Ndl. tonijn, Fr. thon rouge.

152. Kent u een naam voor deze zeer zeldzame vis ?



Hij wordt max. 1 m lang. Zijn kop is stomp, de rug en flanken zijn zwart of donkerbruin en de buik is zilverachtig.

Wet. ben. *Centrolophus niger*, Ndl. /, Fr. centrolophe pompile.




B. Platvissen

153. Hoe heet deze platvis ? Hij kan tot 1 m lang worden. Het ruitvormig lichaam is schubloos, maar bedekt met stompe, benige doornen. Hij is meestal zandkleurig met donkere vlekken. De ogen staan aan de linkerzijde. Wet. ben. *Scophthalmus maximus* (Lin.), Ndl. tarbot, Fr. turbot.



154. Wat is de dialectbenaming voor deze platvis die tot 75 cm lang kan worden ? Het ovale, gladde lichaam is bedekt met kleine schubben. Hij is donker zandkleurig en gevlekt. De ogen staan eveneens links. Wet. ben. *Scophthalmus rhombus* (Lin.), Ndl. griet, Fr. barbue.

155. Kent u een gemeenschappelijke naam voor de twee voorgaande soorten ?




156. Hoe noemt u deze platvis die tot 60 cm lang kan worden ? Hij heeft een grote bek en een naar voren stekende onderkaak. De grote ogen staan aan de linkerkant. Het langwerpige lijf voelt erg slap aan en is net doorschijnend. De zijlijn loopt in een grote boog boven de borstvin. Zijn kleur is geelbruin of roze-grijs, eventueel met donkere vlekjes. Wet. ben. *Lepidorhombus whiffiagonis* (Walbaum), Ndl. scharretong, Fr. cardine of limande salope.




157. Hoe heet deze kleine slanke vis met ogen aan de linkerzijde ? Hij wordt max. 15 cm lang en de zijlijn loopt in een grote boog boven de borstvin. De kleur is geelbruin met donkere vlekjes. Wet. ben. *Arnaglossus laterne* (Walbaum), Ndl. schurftvis, Fr. fausse limande.

158. Kent u deze verwante vis en eventueel zijn naam ? Hij is erg zeldzaam in onze wateren. Hij heeft een breed lichaam en wordt ongeveer 25 cm lang. Hij voelt behaard aan; hij is geelbruin met aan beide zijden van de ogen een donkere band. Hij heeft eveneens een donkere vlek juist boven het midden van de zijlijn. Wet. ben. *Zeugopterus punctatus*, Ndl. /, Fr. targeur, sole des rochers.




159. Hoe heet deze ronde, platte vis die max. 90 cm groot wordt ? De ogen staan aan de rechterzijde, de huid is glad en van boven bruinachtig met rood-oranje vlekken. De vis leeft meestal op een zandige en modderachtige grond en zo is de vis veranderlijk van kleur. Op de kop staat een kam met vier tot zeven stompe doornen. Wet. ben. *Pleuronectes platessa* (Lin.), Ndl. schol of pladijs, Fr. carrelet, plie.




160. Hoe heet een onvolwassen exemplaar van de vorige vraag ?

161. Hoe heet deze verwante vis ? Hij wordt ongeveer 45 cm lang, en de ogen zitten meestal aan de rechterzijde. De huid is glad, maar op de zijlijn en op de basis van de rug- en anaalvin zitten kleine stekeltjes. Hij is bruin, grijsachtig of zelfs groenbruin gekleurd en met onregelmatige oranje vlekjes bezaaid. Wet. ben. *Platichthys flesus* (Lin.), Ndl. bot, Fr. flet.




162. De volgende verwante vis bereikt een maximale lengte van 40 cm. De ogen staan aan de rechterzijde. De huid voelt ruw aan als men van de staart naar de kop wrijft. De zijlijn loopt in een grote boog boven de borstvin. De vis is lichtbruin tot zandkleurig, met kleine onregelmatige vlekjes. Wet. ben. *Limanda limanda* (Lin.), Ndl. schar, Fr. limande commune.




163. Hoe heet een klein, onvolwassen exemplaar van deze soort ?


164. Deze vis wordt max. 65 cm lang. De ogen staan aan de rechterzijde van de kleine kop. De eveneens kleine mond komt niet voorbij het oog. De huid is glad en bruin gekleurd en heeft onregelmatige donkere en geelachtige vlekjes. De soort komt niet algemeen voor. Wet. ben. *Microstomus kitt* (Waldbaum), Ndl. tongschar, Fr. limande sole.




165. Hoe heet deze slanke vis met kleine kop, die ongeveer 50 cm lang wordt. De ogen bevinden zich aan de rechterzijde; de mond reikt niet tot aan het oog. Hij is grijsachtig bruin met een donkere vlek boven de borstvin. De vis is erg zeldzaam in onze wateren. Wet. ben. Glyptocephalus cynoglossus (Lin.), Ndl. hondstong of witje, Fr. (plie) cynoglosse.




166. Hoe heet deze vis die max. 45 cm lang wordt ? De ogen staan aan de rechterzijde van het langwerpige lichaam, de bek reikt tot het midden van het oog. De zijlijn loopt bijna recht. De soort is zeldzaam in onze wateren. Wet. ben. Hippoglossoides plateoides (Fabricius), Ndl. lange schar, Fr. balai, plie canadienne.




167. Hoe heet deze grote vis, die tot 2,5 m lang wordt ? De ogen zitten aan de rechterzijde, en de bek komt ongeveer tot het midden van het dichtstbijzijnde oog. Hij heeft een flinke bek met veel stevige tanden. De vis wordt hier wel veel gegeten, maar hij is zeldzaam in de Belgische wateren. Wet. ben. Hippoglossus hipoglossus (Lin.), Ndl. heilbot, Fr. flétan de l'atlantique.



168. Hoe heet deze zeer gegeerde vissoort, die tot 60 cm lang wordt ? De ogen zitten aan de rechterzijde. De voorste neusopening (aan de blinde zijde) is iets groter dan de tweede neusopening. De kleur is variabel, meestal zandkleurig met een zwarte vlek aan het bovenste uiteinde van de borstvin. Wet. ben. Solea solea (Lin.), Ndl. tong, Fr. sole.




169. Hoe noem je een heel klein exemplaar van deze soort ?
170. Hoe heet een exemplaar van middelbare grootte ?
171. Hoe heet een heel groot exemplaar ?
172. Zo er meer namen zijn naar de grootte, geef dan de verschillende benamingen en de overeenkomstige grootte of het gewicht.




173. Hoe heet deze verwante soort die slechts 35 cm groot wordt ? De huid voelt ruwer aan dan van de gewone soort. De voorste neusopening (aan de blinde zijde) is groot en met een franjekrans omgeven. De vis is geelbruin; in het midden van de borstvin bevindt zich een zwarte vlek. Wet. ben. *Solea lascarsis* (Risso), Ndl. Franse tong, zand tong, Fr. sole.

174. Een andere verwante soort is ovaal en tamelijk dik en wordt slechts 22 cm groot. De vis is het gemakkelijkst te herkennen aan zijn kleur. Die gaat van grijsachtig geel naar roodachtig bruin met ongeveer vijf donkere dwarsbanden die zich uitstrekken van de rugvin tot de aarsvin. Wet. ben. *Solea variegata* (Fleming), Ndl. Franse tong, gestreepte tong, Fr. sole.

175. Hoe heet deze verwante dwergsoort die max. 13 cm lang wordt ? Hij is zandkleurig met een gele schijn. De borstvin aan de blinde zijde is weinig ontwikkeld; in de rug- en anaalvin is er om de 5 à 6 stralen een zwarte straal. Wet. ben. *Buglossidium luteum* (Risso), Ndl. dwergtong, Fr. petite sole jaune.



176. Hoe heet deze vis die ongeveer 40 cm lang wordt ? Het lichaam is hoog en zijdelings samengedrukt. De bek is klein, maar de tanden zijn groot en stevig. De eerste rugvin bestaat uit drie stekels, de staartvin is gevorkt. De kleur is variabel : van grijs tot groenachtig; boven het oog zitten groenen en/of blauwe strepen. Deze soort is zeldzaam. Wet. ben. *Balistes capriscus*, Ndl. trekkervis, Fr. poisson-pore, baliste caprisque.



177. Hoe heet deze vis die tot vier meter groot kan worden, maar in de Noordzee altijd kleiner blijft ?

Het lichaam is hoog en afgerond; de bek is klein. De rug- en anaalvin zijn groot en de toppen afgerond. De buikvinnen ontbreken en de staartvin is weinig ontwikkeld. Wet. ben. *Mola mola* (Lin.), Ndl. maanvis, Fr. poisson-lune.

